


¿Cómo puedes evitar un nuevo embarazo?

Usa un método anticonceptivo



Recuerda que inmediatamente después de tomar misoprostol, puedes quedar embarazada.



Tu siguiente menstruación se presentará de 4 a 6 semanas después de la interrupción de tu embarazo

Es importante que cuentes con un acompañamiento por parte de personal capacitado y especializado. Si deseas mayor información recuerda que puedes acudir y/o consultar en los siguientes espacios, hay diversas opciones a la cuales puedes acceder:

• Hospital Civil Aurelio Valdivieso
Calle Porfirio Díaz 407, Reforma,
68000 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Tel. 951 688 5112

• Fundación Marie Stopes México,
sede Oaxaca
<https://mariestopessmexico.mx>
Tel. 951 688 5112

• Red por los derechos sexuales y reproductivos en México, ddeser Oaxaca
Facebook: Siempreviva, Mujeres con autonomía
Facebook: ddeser Oaxaca
Tel. 5516548886

• Siempreviva: Mujeres con autonomía.
Facebook: Siempreviva, Mujeres con autonomía
Facebook: ddeser Oaxaca
Tel. 9514267151

*Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

ABORTO CON MEDICAMENTOS

En Oaxaca las mujeres podemos decidir interrumpir un embarazo hasta la semana 12 de gestación*, esto es posible ya que en septiembre de 2019 se aprobó la despenalización del aborto, garantizando así nuestro derecho a la Autonomía Reproductiva.

La despenalización no obliga a ninguna mujer a abortar si no lo desea, es una opción, por ello, aquí te compartimos información que puedes ser útil.

*Se cuenta a partir del primer día de tu última menstruación, se debe verificar el número de semanas con un ultrasonido.

GUÍA PARA USO DE MISOPROSTOL

¿Cómo usar el misoprostol?

